# MESURE DE LA REFRACTION OBJECTIVE CHEZ L'ENFANT

J.L. DUFIER

A.F.O.P. 12 .V. 2015

### SIGNES FONCTIONNELS D'APPEL

FLECHISSEMENT SCOLAIRE

CEPHALEES FRONTALES LE SOIR

MANIFESTATIONS DES ANNEXES

ROUGEUR CONJONCTIVALE
BLEPHARITE CHRONIQUE ORGELET CHALAZION

TRIADE ASTIGMATISME- HETEROPHORIE- BLEPHARITE CHRONIQUE

SENSATION DE VISION TROUBLE (DOUBLE)

**STRABISME** 

MICROPSIE.....

#### REFRACTION OBJECTIVE

ENFANT RESERVE ACCOMMODATIVE 14 D

SEUL L'EXAMEN SOUS CYCLOPLEGIE PERMET

- MESURE OBJECTIVE DE LA RÉFRACTION
- SUPPRESSION DE L'INEVITABLE ACCOMMODATION D'INSTRUMENT
- CORRECTION OPTIQUE TOTALE

#### REFRACTION OBJECTIVE

```
AUGUST. K. 20 IX 2010 P 10 279
5.XII.14 ADRESSE POUR STRABISME CONVERGENT RECENT « AMBLYOPIE RELATIVE OG »
       S/C 8/10 R2 WI
                                                 S/C 2/10 R2W1
                 FODG NORMAUX ET 20 E'T 25 ODF
RA --7.50 (+1.00 à 20)
                                                  --5.5
                                                  --6.00 (+ O.25 à 0)
     --6.75 (+0.50 à 62)
     --6.50 (+0.50 à 71)
                                                  --6.25 (+O.25 à 94)
     --7.00 (+0.75 à 60)
                                                  --6.00 (+0.25 à 92)
     --7.75 (+ 1.75 à 45)
                                                  --6.00 (+0.25 à 91)
     --6.75 (+0.25 à 44)
                                                  --6.00 (+0.25 à 90)
     --7.25 (+1.00 à 27)
                                                  -- 5.75
     --7.25 (+1.00 à 28)
                                                  --6.25 ( + 0.25 à 54 )
     --7.00 (+0.75 à 45)
                                                  --6.00 ( + 0.25 à 91)
23. XII.14 VU SOUS ATROPINE 0.5% MATIN ET SOIR SIX JOURS
RA + 3.00
                                                  + 2.50
10.IV.15
                                                   + 2.50 10/10 R2W1
       + 3.00 10/10 R2 W1
                               ORTHOPHORIQUE
```

# REFRACTION OBJECTIVE SOUS CYCLOPLEGIE

ATROPINE CYCLOPENTOLATE TROPICAMIDE

QUELLE TECHNIQUE CHOISIR?

## REFRACTION OBJECTIVE ETUDE

#### **ENFANTS ET METHODE**

SERIE CONSECUTIVE DE 36 YEUX DE 18 ENFANTS 12 GARÇONS ET 6 FILLES AGE MOYEN 3 ANS (21 MOIS A 9 ANS)

#### MOTIFS DE CONSULTATION

OTD A DIONAL OOM / CDOCKIT

STRABISME CONVERGENT	6
DIFFICULTÉS SCOLAIRES, PAR FATIGUE VISUELLE	5
SPASMES D' ACCOMMODATION	4
CÉPHALÉS PERSISTANTES	1
BILAN DE SURDITÉ	,
EXAMEN SYSTÉMATIQUE DANS LA FRATRIE	

### REFRACTION OBJECTIVE ETUDE

#### MATERIEL ET METHODE

-CYCLOPENTOLATE TROPICAMIDE VERSUS ATROPINE

TROPICAMIDE 1 INSTILLATION 2 GOUTTES 20 MN AV. EXAMEN

CYCLOPENTOLATE 3 INSTILLATIONS À 5 MN 2 GOUTTES 45 MN AV. ,,

ATROPINE 0,3 % JUSQU'A 3 ANS 0,5 % AU-DELA DE 3 ANS

2 GOUTTES MATIN ET SOIR 6,5 JOURS AV. ,,

-MESURES: RÉFRACTEUR OBJECTIF AUTOMATIQUE PORTABLE A INFRA - ROUGE

#### REFRACTION OBJECTIVE RESULTATS

CORRECTION SPHERIQUE A NETTE DEPENDANTE DE L'ACCOMMODATION

-TROPICAMIDE VERSUS ATROPINE  $\Delta P$ : 3,08 D ( $\sigma$ : 1,10) -CYCLOPENTOLATE VERSUS ATROPINE  $\Delta P$ : 1,57 D ( $\sigma$ : 0,84)

CORRECTION CYLINDRIQUE A NON SIGNIFICATIVE

PUISSANCE ET AXE DEPENDANTS DU DIOPTRE CORNEEN ANTÉRIEUR

AUCUN EFFET SYSTEMIQUE INDESIRABLE

COMPRIMER ET EPONGER L'ANGLE INTERNE AVEC UNE COMPRESSE NE PAS LAISSER LE FLACON À LA PORTEE DES ENFANTS VIDER ET JETER LE FLACON APRES USAGE

### **BILAN PRE - OPERATOIRE DU STRABISME**

Tiphaine B. 4 ans

STRABISME CONVERGENT ALTERNANT CONGENITAL

S/C

E<sup>T</sup>80 E'<sup>T</sup>90

A/C APRES CYCLOPENTOLATE

+1,25 (+0,5 à 0) 10/10 +1,50 (+1 à 130) 10/10 E<sup>T</sup>50 E'<sup>T</sup>60

A/C APRES ATROPINE A 0,5 % 6 JOURS

+3,00 (+0,25 à 170) 10/10

E<sup>T</sup>35 E'<sup>T</sup>45

+3,00 (+0,50 à 135) 10/10

## REFRACTION OBJECTIVE DISCUSSION

### -ATROPINE

#### EXAMEN DE REFERENCE INCONTOURNABLE

- -INDISPENSABLE DANS LE BILAN DU STRABISME
- -PLUS CONTRAIGNANT POUR LES PARENTS
- MISE AU REPOS DE L'ACCOMMODATION PENDANT 15 JOURS

EXAMEN A LA FAVEUR DE VACANCES POUR NE PAS GENER LA SCOLARITÉ

## REFRACTION OBJECTIVE DISCUSSION

### -CYCLOPENTOLATE

-UTILISATION PLUS AISEE: 45 À 60 MINUTES

-CYCLOPLEGIE INFERIEURE ET MOINS FIABLE :

TANTÔT PROCHE, TANTÔT TRES ELOIGNEE DE LA MESURE SOUS ATROPINE SANS QUE L'ON PUISSE DEVINER CHEZ QUELS ENFANTS

-CONSEQUENCE: ERREURS BILAN ORTHOPTIQUE D' UN STRABISME

**CORRECTION OPTIQUE TOTALE** 

-PLUTÔT INDIQUE DANS LA SURVEILLANCE D' UNE REFRACTION INITIALEMENT MESUREE SOUS ATROPINE

# REFRACTION OBJECTIVE DISCUSSION

### -TROPICAMIDE

A PEINE CYCLOPLEGIQUE

ESSENTIELLEMENT MYDRIATIQUE DESTINE A L'EXAMEN DU CRISTALLIN ET DU FOND D'OEIL

### REFRACTION OBJECTIVE BIBLIOGRAPHIE

## CES RÉSULTATS CORROBORENT CEUX DE L'ÉTUDE PUBLIÉE PAR

GHAZI I. et Coll.

ETUDE COMPARATIVE ENTRE LA CYCLOPLÉGIE SOUS ATROPINE ET LA CYCLOPLÉGIE SOUS CYCLOPENTOLATE

OPHTALMOLOGIE; 1991;5:390-392

### CONCLUSION

# CYCLOPLEGIE ATROPINIQUE

NI COUTUME ANCESTRALE

NI DOGME

NI LOI

### **FONDEE SUR DES PREUVES**

# AMETROPIES DE L'ENFANT

PRISE EN CHARGE
ETROITE COLLABORATION
OPHTALMOLOGISTE - ORTHOPTISTE - OPTICIEN